Ledafol mg

FICHA TÉCNICA

Un producto de la familia

Ledarol Crop Science

Ledafol mg

FICHA TÉCNICA

Un producto de la familia Ledarol Crop Science

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO:

Nombre comercial:	LEDAFOL Mg
Ingredientes activos:	Aminoácidos de origen vegetal
	Aminoácidos totales 20%
	Aminoácidos libres 11%
	Quelato de Mg 20%
	Macronutrientes (N-P-K-Ca-Mg)
	Micronutrientes (Zn-B-Mn-Fe)
	Extracto de algas marinas (*Ascophyllum nodosum*) 6%
	Ac. fúlvicos
Nombre químico:	Fertilizante - Bionutriente Líquido
Formulación:	Concentrado Soluble, SL.
Modo de acción:	Absorción Foliar
pH:	4.0 - 4.2
Densidad:	1.1 g/L
Cultivos:	Frutales caducifolios, Cultivos De Vid, Cítricos, Palto, Arándanos, Granado, Frutas tropicales y subtropicales, Legumbres, Cereales, Tubérculos, Cultivos de Coles, Cucurbitáceas, Verduras de hojas verdes, Arbolado y Plantas Ornamentales, y muchos otros cultivos.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

LEDAFOL Mg es un poderoso Fertilizante Bioestimulante, obtenido a partir de hidrólisis enzimática bajo condiciones controladas del Salmón, una de las mejores fuentes disponibles de proteína animal. El resultado es un producto con alta disponibilidad y calidad de aminoácidos libres cuyo bajo peso molecular garantiza una asimilación más eficiente vía foliar. Los diversos compuestos del producto son aprovechados por las plantas aumentando su crecimiento y producción, así como también proporcionan una gran variedad de mejoras fisicoquímicas y biológicas en las cosechas.

Ledafol mg

FICHA TÉCNICA

Un producto de la familia Ledarol Crop Science

LEDAFOL Mg está enriquecido con extracto de algas marinas (Ascophyllum nodosum), el cual permite sobrellevar distintos tipos de estrés (nutricional, salino, hídrico, luminoso, contaminantes atmosféricos, entre otros) y mejora el desarrollo vegetativo y la producción de los cultivos en general.

LEDAFOL Mg contiene quelato (EDTA) de Magnesio, el cual permite que este elemento esté disponible de forma inmediata para ser absorbido por el follaje y prevenir o corregir las deficiencias de Magnesio presentes en los cultivos. LEDAFOL Mg proporciona magnesio activo, estable, quelatado y protegido, en forma soluble y totalmente asimilable que permite mejorar el metabolismo activando la síntesis de clorofila, carbohidratos, respiración y madurez de los cloroplastos.

Algunos de los beneficios de LEDAFOL Mg en los cultivos son:

- Aporte nutricional directo de aminoácidos de alta asimilación, generando un ahorro considerable de energía para la planta.
- Rápida recuperación de plantas sometidas a estrés biótico, abiótico, reduciendo la pérdida del potencial productivo.
- Gran soporte durante las fases de actividad metabólica elevada (trasplante, brotación, floración, fructificación, etc.).
- Favorece el desarrollo radicular (contiene triptófano que es precursor de AIA)
- Mejora la población de microflora del suelo.
- Contiene fitohormonas naturales que favorecen un mayor crecimiento y movilización de nutrientes en los órganos vegetativos. Esto permite mejorar la estructura de la planta, desarrollo radicular, floración, formación y acumulación de reservas en los frutos, etc.
- Induce una mayor absorción de los nutrientes, incrementa el tamaño de hojas, resultando en un mayor rendimiento y calidad de las cosechas.
- Ayuda a prevenir y a corregir las deficiencias de Magnesio en los cultivos.
- Incrementa las características de calidad de los frutos y órganos a cosechar.
- Al ser el Mg el elemento central de la clorofila, su rápida asimilación vía foliar incrementa el contenido de clorofila, promoviendo la fotosíntesis, y aumentando la síntesis de materia orgánica (traslocación de los azúcares a los órganos de reserva).

RECOMENDACIONES DE USO:

LEDAFOL Mg puede ser aplicado por vía foliar.

INSTRUCCIONES DE USO:

CULTIVO	DOSIS/ha	NÚMERO DE APLICACIONES	ÉPOCA DE APLICACIÓN
Uva de mesa	4 - 5 L	E	A partir de crecimiento de brote de 15 - 20 cm
Arándano	3 - 4 L	3 - 5	A partir de crecimiento de brote de 15 - 20 cm
Palto	4 - 5 L	4 - 5	A partir de inicio de Brotación
Cítrico	4 - 5 L	4 - 5	A partir de inicio de Brotación
Olivo	4 - 5 L	4 - 5	A partir de inicio de Brotación
Leguminosas de grano	3 - 4 L	4 - 5, una cada 15 días	A partir de la quinta hoja verdadera
Papa, camote	3 - 4 L	4 - 5	1º Brotación 2º Crecimiento Vegetativo 3º Tuberización
Cebolla	3 - 4 L	4 - 5	1º Brotación 2º Crecimiento Vegetativo 2º Inicio de formación del bulbo
Manzano, peras, duraznos	4 - 5 L	E	A partir de crecimiento de brote de 15 - 20 cm
Hortalizas	3 - 4 L	3 - 5	De 15 a 20 días después de la emergencia. 10 días después de la primera aplicación, y luego cuando haya deficiencias.
Melón, sandía, pepino	3 - 4 L	3 - 5	De 15 a 20 días después de la emergencia. 10 días después de la primera aplicación, y luego cuando haya deficiencias.

COMPATIBILIDAD: No mezclar con productos de extremada reacción ácida o alcalina. Es compatible con productos fitosanitarios, sin embargo se recomienda realizar previamente pruebas de aplicación a nivel de campo.

PRECAUCIONES EN EL MANEJO Y APLICACIÓN:

- Evitar el contacto con los ojos, piel y ropa.
- No comer, beber, ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- Usar la mezcla inmediatamente después de preparada.
- No almacene ni transporte conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No es tóxico para humanos o animales.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES:

Después de usar el contenido enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase y devolverlo al centro de acopio.